



HUMATM
GRO[®]

Recomendaciones Huma Gro en etapas específicas de los cultivos

M.C. Luis Eduardo Sánchez Gómez

Mejora del Suelo (Sales, Compactacion, etc)

- Soil-Max™ 3 lt/Ha ó 10 ml /mt³ de agua en continuo
- Zap® 2.5 lt/Ha



Desarrollo de Raiz

Aplicación vía goteo

Breakout® 2.5 lit/ha.

Soil-Max™ 3 lit/ha

Phos-Max™ 3 lit/ha

- Activación de los aminoácidos: leucina, Isoleucina, Triptófano, Glutamina.
- Activación de las Vitaminas: B1, B2 y C

Nota: repeticiones cada 30 días y después de cada corte. Intercalar con Vitol 2.5lit para alargar las raíces



Arrancador y Desarrollo Vegetativo

Aplicación al Riego por goteo:

- **Vitol® 2.5lit/ha**
- **Super Nitro® 3lit/ha**
- **Phos-Max™ 3lit/ha**
- **Soil-Max™ 3lit/ha**

Nota: En los primeros 45 días de desarrollo y en estrés por frío.



Arrancador y Desarrollo Vegetativo

Aplicación foliar:

- Vitol® 1.5lit/ha
- Super Nitro® 3lit/ha

- **Nota:** En los primeros 45 días de desarrollo y en estrés por frío.
Repeticiones cada 8 -10 días.



Amarre de Flor y cvuajado de Fruta

- **Breakout[®]** Dosis **2 lit. / Ha**
- **Phos-Max[®]** Dosis **1.5 lit. / Ha**



Activación de : Vit. D, P ,N, Ca, B, Mo, Silicio, Zn, Mn, Co, Vanadio, Activación interna de Aire y Agua.



Viabilidad de Polen (Estrés por Temperatura)

Aplicación Foliar:

- **Breakout®**

Dosis **1.5 ml / Lt**

Aumenta la velocidad de desarrollo x 3 del tubo polínico y aumenta el número de semillas del fruto. Se usa en floración o cuando se inician los cuajado

- **Z-Max®**

Dosis **2.5 ml / Lt**

Nota: Repeticiones cada 10-12 días, en chiles, tomates, tomatillos.



Engorde de Fruta (Riego Goteo)

- **Vitol®**
Dosis 1 – 2.5 Lt / Ha
- **Soi-Max™ 2.5lit/ha**

Nota: Repeticiones cada 12-14 días. (Tomates, chiles, sandias
Tomatillos, berenjenas).



Engorde de Fruta (Foliar)

- **Vitol®**

Dosis 1.5 a 2 lit/ha o 5 ml / Lt

Super K™ 1 – 2 lt/Ha.

Nota: Repeticiones cada 10-12 dias. Entre cada aplicación de Via riego. (tomates, chile bell, tomatillos, berenjenas, sandia)



Color de Fruta

Foliar:

- Phos-Max™ 1 Lt/Ha
- Super K™ 1.5 Lt/Ha

Nota: Repetir cada 8 días, en tomates después de cada corte de Racimo. (chiles, tomates, tomatillos, pepinos, berenjenas, calabaza, ejotes, Uvas, etc).

- Activador de: Metionina, Vit. C, Selenio, Ca, Si, Cr y Vanadio
- Vitamina E, Vit. D
- Desequilibrio Nutricional 40%,



Adelanto de Maduración (Aumentar Grados Brix)

- **Yield-Max™ 3 lt / Ha + Calcium 1 Lt/Ha**

Nota: Repeticiones cada 8-10 días, en tomates se pueden hacer
Cada semana o en racimos próximos a corte.

